

**Exkursion im Winterwald vom 01.02.2025**

## **Von der Fruchtschicht zur Grob - «Beurteilung»**

(gilt für ausgewählte relativ häufige Pilze !)

### **Pilze mit ± rundlichen Poren**

- Trameten (flach-scheibenförmig, zäh, eher weich, Oberfläche oft gezont)  
zB Schmetterlingstramete, Striegelige Tramete, Angebrannter Rauchporling

- Baumschwämme (gross, hart, konsolenartig abstehend)  
zB Rotrandiger Baumschwamm, Zunderschwamm, Feuerschwamm

### **Pilze mit ± langgestreckten Poren**

- Trametenhabitus: zB Buckeltramete, Rötende Tramete  
- knollig-kissenförmig, aromatisch riechend: Fenchelporling

### **Pilze mit blätterartiger und/oder labyrinthischer Fruchtschicht**

- Blättlinge (zB Birkenblättling, Zaun- und Tannenblättling)  
- Wirrlinge (zB Eichenwirrling)  
- Krauser Adernzähling (Buchenadernzähling)  
- Gallertfleischiger Fältling  
- Spaltblättling

### **Pilze mit ± glatter Fruchtschicht**

Schichtpilze (zB Striegeliger Schichtpilz, Samtiger Schichtpilz)

### **Pilze mit rein flächenhaftem Wachstum, Fruchtschicht ± glatt**

Rindenpilze

### **Pilze mit Hut und Stiel**

Harziger Sägeblättling  
(Winter)Trompetenschnitzling  
Zwergknäueling (Stiel kurz-seitlich)  
Winterstielporling

### **Pilze mit gallertigem Fruchtkörper**

zB Warziger Drüsling, Goldgelber Zitterling

**(Speisepilze: Austernseitling, Samtfussrübling, Judasohren)**